

Recommandations de base pour éviter la transmission du FCoV

Grand public

- Disposez au moins un bac à litière par chat (idéalement un par chat plus un bac supplémentaire)
- Placez les bacs à litière le plus loin possible des gamelles d'eau et de nourriture
- Utilisez de la litière agglomérante
- Nettoyez (enlevez les agglomérats) des bacs à litière au moins une fois par jour (idéalement, deux fois, voire plus)
- Arrangez-vous pour qu'il vous soit facile de nettoyer les bacs à litière aussi souvent que possible (placez les bacs aux endroits où vous passez souvent dans la journée)
- Mettez un tapis anti-poussière devant le bac à litière
- Passez l'aspirateur fréquemment autour des bacs (au moins une fois par jour - idéalement gardez un aspirateur à main à proximité et passez le chaque fois que cela est nécessaire)
- Désinfectez les bacs à litière à la vapeur ou à l'eau bouillante et au désinfectant au moins une fois par semaine (idéalement à l'eau de javel diluée à 1 pour 32. Vous pouvez aussi utiliser de la vapeur et l'alcool chirurgical. Attention à éviter tout désinfectant contenant du phénol, qui est toxique pour les chats : beaucoup de désinfectants à base de pin contiennent du phénol)
- Raccourcissez la fourrure de l'arrière-train (pattes et queue) des chats à poils longs (réduisez la "culotte" pour éviter que des fèces y restent accrochées).

