



EndFIP®



Raccomandazioni basilari per prevenire la trasmissione del FCoV

Pubblico generico

- Metti a disposizione almeno una lettiera per ogni gatto presente nell'ambiente (l'ideale sarebbe averne una per ogni gatto più una extra)
- Posiziona le lettiere il più lontane possibili dal cibo e dall'acqua
- Pulisci le lettiere almeno una volta al giorno (possibilmente due o più)
- Fai in modo che sia il più semplice possibile pulire le lettiere con grande frequenza (posizionandole, ad esempio, in luoghi dove passi spesso durante il giorno)
- Utilizza sabbia per lettiera che non lasci residui (agglomerante)
- Utilizza un tappetino che catturi i residui di sabbia all'esterno della lettiera
- Passa spesso l'aspirapolvere (almeno una volta al giorno – l'ideale sarebbe avere un'aspirapolvere a portata di mano accanto alle lettiere, così da poter passare il pavimento lì vicino ogni volta che ce n'è bisogno)
- Sterilizza le lettiere con vapore o acqua bollente e disinfettante almeno una volta a settimana (l'ideale è un mix di candeggina e acqua bollente in soluzione di 1:32). Altre opzioni includono il vapore e disinfettanti chirurgici. Assicurati, per piacere, di non utilizzare disinfettanti che contengano fenolo poiché è tossico per i gatti: la maggior parte dei prodotti all'aroma di pino lo contengono.
- Accorcia il pelo dei tuoi gatti sulle cosce e sulla coda (accorciare i "calzoncini" nei gatti a pelo lungo riduce la possibilità che particelle fecali vi rimangano intrappolate).

