



Protocolo ideal para la prevención de la infección FCoV en gatitos

Criaderos de gatos de raza |

Refugios de rescate |

Hogares privados



Los gatitos nacen libres de FCoV. Ayúdales a tener la vida larga y saludable que se merecen.



El coronavirus felino (FCoV) no atraviesa la placenta y no infecta a los gatitos antes de nacer. Los gatitos están protegidos contra la infección FCoV por los anticuerpos que reciben en la leche de su madre, cuando estos anticuerpos disminuyen alrededor de las 5-7 semanas de edad, los gatitos se convierten susceptibles a la infección FCoV y por consiguiente al riesgo de FIP (Peritonitis Infecciosa Felina - PIF).

No invites dolor y sufrimiento a sus vidas y a la tuya. La PIF no discrimina y es despiadada. Por favor evita que los gatitos sean infectados por el FCoV.



• Preparar las áreas de corrales/anidamiento de gatitos

- En albergues o grupos de rescate, desinfectar corrales entre ocupantes con una dilución 1:32 de hipoclorito de sodio (cloro) y agua caliente
- En criaderos de gatitos de raza o en casas de familia, la reina (Mama) buscará un espacio acogedor y tranquilo para dar a luz. Puedes ayudar a crear esta área proporcionando una caja o tina recién limpiadas y forradas con toallas limpias. Una vez preparada, coloca la caja o tina en una habitación tranquila y oscura. Por favor, limpia los pisos y superficies usando la dilución 1:32 de hipoclorito de sodio y agua caliente mencionada anteriormente
- Aspira con diligencia y cuidado, quitando las partículas de polvo microscópicas y arena usada por gatos infectados
- Utiliza bandejas para arena y platos de comida y agua de diferente color para la sección donde están los gatitos y desinfecta con frecuencia con hipoclorito de sodio (dilución 1:32 – lo que significa 1 taza de blanqueador y 31 tazas de agua caliente). Asegúrate de enjuagar los platos completamente en agua caliente después de desinfectar.
- Proporciona toallas y colchas suaves recién lavadas, evitando cualquier tipo de olores químicos

• Enfermería de práctica barrera

- Atiende la sección de gatitos antes de cuidar la de otros gatos. En otras palabras, comienza con la sección menos infectada y poco a poco pasar a la zona más infectada (gatos activamente infectados con FCoV)
- Lavate las manos con desinfectante antes de entrar en la sección de gatitos
- Ten zapatos y tunicas (ropas) dedicadas a la sección de gatitos
- Los grandes refugios deben tener baños de pies con desinfectante entre cada área

• Destete precoz y el aislamiento del gatito

- Hazle la prueba de anticuerpos FCoV a la reina antes o después de dar a luz.
- Si el título de anticuerpos de la reina es mayor que cero, los gatitos deben separarse a otra habitación limpia cuando tengan 5-6 semanas de edad, o al menos mantener la bandeja de arena de la reina fuera del alcance de los gatitos.
- Si la reina tiene un título de anticuerpos de cero (libre de FCoV), ella puede permanecer con los gatitos hasta que sean mayores
- Tenga a los gatitos aislados de cualquier otro gato infectado con FCoV
- Cuando los gatitos tengan 10 semanas de edad, se les puede hacer la prueba de anticuerpos FCoV

EndFIP®: una visión y una misión

Concientizar

Recaudar fondos para la investigación
Erradicar el FCoV y poner fin a la PIF