



Protocollo ottimale per la prevenzione dell'infezione da FCoV nei cuccioli.

Allevamenti



Gattili



Case private



I gattini nascono esenti dal FCoV. Aiutali ad avere la vita lunga e sana che si meritano.



Il coronavirus felino (FCoV) non può attraversare la placenta e infettare i cuccioli nel grembo materno. I gattini sono protetti dall'infezione da FCoV dagli anticorpi materni, che ricevono mediante l'allattamento; quando questi anticorpi calano intorno alle 5-7 settimane di età divengono suscettibili al FCoV e, conseguentemente, al rischio di contrarre la FIP.

Non invitare ad entrare nella tua vita e in quelle dei tuoi gatti il dolore e il dispiacere che questa malattia porta. La FIP non discrimina ed è spietata. Previene l'infezione da FCoV nei tuoi cuccioli.



- **Prepara un recinto o un'area esclusiva per i gattini**

- Nei gattili o nei rifugi è necessario disinfettare le gabbie nel cambio da un ospite all'altro utilizzando una soluzione di 1:32 di sodio ipoclorito (candeggina) e acqua bollente
- Negli allevamenti o nelle case private la fattrice cercherà un luogo accogliente e tranquillo per partorire. Puoi aiutarla creando un'area a lei dedicata con una scatola o un catino imbottiti di asciugamani morbidi e puliti in un luogo silenzioso, come una camera buia. Per piacere, lava accuratamente i pavimenti e le superfici di quest'area utilizzando la soluzione 1:32 di sodio ipoclorito e acqua bollente, menzionata al punto sopra
- Passa accuratamente l'aspirapolvere, rimuovendo ogni microscopica particella di polvere di lettiera infetta
- Utilizza un codice colore per le lettiere e le ciotole di acqua e cibo che saranno dedicate esclusivamente all'area dei cuccioli e disinfetta anche queste frequentemente con sodio ipoclorito (soluzione 1:32 – significa una tazza di candeggina per 31 tazze di acqua bollente). Per piacere, assicurati di risciacquare le ciotole accuratamente con abbondante acqua calda dopo averle disinfettate
- Rifornisci l'area dei cuccioli di cucce accoglienti e appena lavate, evitando qualsiasi profumazione chimica

- **Pratica l'assistenza in isolamento**

- Prenditi cura dell'area dedicata ai cuccioli prima di accudire gli altri gatti; ciò significa partire nella gestione quotidiana sempre dall'area meno infetta dell'ambiente e gradualmente muoversi verso quella maggiormente infetta (ad esempio dove si trovano gatti che diffondono attivamente FCoV nelle proprie feci)
- Lavati le mani e disinfettale prima di recarti nell'area dei cuccioli
- Utilizza vestiti e scarpe specifici per recarti nell'area dei cuccioli
- I rifugi o gattili molto grandi dovrebbero avere vasche per disinfettare le calzature fra un'area e l'altra della struttura

- **Svezzamento precoce e isolamento dei gattini**

- Testa la tua fattrice per gli anticorpi del FCoV sia prima che dopo il parto
- Se il titolo anticorpale della fattrice è maggiore di zero, allora i gattini dovrebbero essere separati e trasferiti in un'area diversa e pulita dell'ambiente quando avranno fra le 5 e le 6 settimane di vita, o si dovrebbe almeno posizionare la lettiera della madre fuori dalla loro portata
- Se la fattrice ha un titolo anticorpale pari a zero (ossia è esente dal FCoV) può rimanere con i suoi cuccioli fino a che non saranno completamente svezzati
- Tieni i gattini isolati da ogni altro gatto presente nell'ambiente che sia infetto da FCoV
- A 10 settimane di vita testa i gattini per gli anticorpi del FCoV

EndFIP®: una visione e una missione

Portare consapevolezza

Raccogliere fondi per la ricerca

Eradicare il FCoV e mettere fine alla FIP



www.endfip.com

