



## Protocollo ideale per minimizzare l'introduzione e la diffusione del FCoV nell'ambiente



### Allevamenti

### Gattili e rifugi



- **Riduzione del numero di gatti presenti in ogni area dell'ambiente**
  - Nelle strutture come gattili e rifugi i gatti dovrebbero essere tenuti in gabbie singole (se ciò non è possibile, comunque non più di 2 gatti per gabbia)
  - I gatti dovrebbero essere separati in piccoli gruppi, secondo il loro titolo anticorpale o il loro status di secrezione del virus nelle feci
    - gatti negativi al virus insieme
    - gatti positivi al virus insieme
- **Prevenzione dell'infezione nei cuccioli**
  - I volontari di un gattile o i proprietari di una fattrice dovrebbero seguire il protocollo di "svezzamento precoce", descritto più sotto
- **Riduzione della contaminazione fecale nell'ambiente**
  - Possiedi un numero di lettiera adeguato (1 lettiera ogni 1-2 gatti)
  - Possiedi un numero adeguato di palette (1 per ogni lettiera)
  - Pulisci le lettiere almeno una volta al giorno (utilizzando la relativa paletta)
  - Utilizza una sabbietta per lettiera che sia agglomerante
  - Rimuovi tutta la sabbietta e disinfetta le lettiere almeno una volta a settimana
  - Posiziona le lettiere lontane da cibo e acqua
  - Lava le ciotole con acqua bollente (possibilmente in lavastoviglie con un programma ad alta temperatura – 60°C)
  - Lava le cucce con acqua bollente (60°C)
  - Passa l'aspirapolvere nella zona delle lettiere regolarmente
  - Nei gatti a pelo lungo, accorcia il pelo nella zona della coda e delle zampe posteriori
  - Disinfetta le gabbie nel passaggio da un ospite all'altro utilizzando una soluzione di 1:32 di sodio ipoclorito (candeggina) e acqua bollente
  - Lascia vuote le gabbie (se possibile)
  - Passa l'aspirapolvere con cura e pulisci con un disinfettante non nocivo per i gatti e vapore (se possibile)
  - Nei rifugi e gattili, fai in modo tale che i volontari riferiscano sempre al responsabile della struttura se notano segni di malessere in un gatto
  - Per piacere, isola i gatti malati per evitare che l'infezione si diffonda (non solo in caso di FCoV)