



Protocolo ideal para reducir al mínimo la introducción o propagación del FCoV



Criadores de gatos



Refugios de rescate

- **Reducir el número de gatos en cualquier área**

- En los refugios de rescate los gatos deben mantenerse separados (si no es posible – no más que 2 gatos por jaula)
- Los gatos deben mantenerse en pequeños grupos según su estado de excreción de virus o anticuerpos
 - Gatos con anticuerpos o virus negativo juntos
 - Gatos con anticuerpos o virus positivo juntos

- **Prevención de la infección FCoV a los gatitos**

- Rescatistas o los dueños de gatas embarazadas deben seguir el protocolo de "destete precoz y aislamiento" que se detalla a continuación:



- Hazle la prueba de anticuerpos FCoV a la reina antes o después de dar a luz.
- Si el título de anticuerpos de la reina es mayor que cero, los gatitos deben separarse a otra habitación limpia cuando tengan 5-6 semanas de edad, o al menos mantener la bandeja de arena de la reina fuera del alcance de los gatitos.
- Si la reina tiene un título de anticuerpos de cero (libre de FCoV), ella puede permanecer con los gatitos hasta que sean mayores
- Tenga a los gatitos aislados de cualquier otro gato infectado con FCoV
- Cuando los gatitos tengan 10 semanas de edad, se les puede hacer la prueba de anticuerpos FCoV



- **Reducción de la contaminación fecal del medio ambiente**

- Tenga el número adecuado de bandejas para la arena (1 bandeja por 1-2 gatos)
- Tener el número adecuado de palas (1 x cada bandeja)
- Las bandejas (areneros) se deben limpiar al menos una vez al día removiendo todo lo sólido (usando sus propias palas)
- Utilice arena para gatos con poca tracción
- Vaciar los areneros y desinfectar las bandejas por lo menos una vez por semana
- Coloque los areneros lo más lejos posible de los platos de comida y agua
- Lavar platos de comida y agua en agua caliente (lavavajillas ciclo caliente -140F / 60 ° C)
- Lave toallas, colchas y cualquier otra cosa que los gatos usen en agua caliente (140F / 60 ° C)
- Aspire cuidadosamente alrededor de los areneros
- Corte el pelo en los cuartos traseros de los gatos de pelo largo
- Desinfecte corrales entre ocupantes con una dilución 1:32 de hipoclorito de sodio (cloro) y agua caliente
- Aspire los pisos diligentemente y límpielos con desinfectantes no tóxicos para los gatos. Otra opción es limpiar los pisos con vapor.
- En los refugios de rescate, por favor capacitar a su personal o los voluntarios para que utilicen guantes y cambiarlos regularmente (cada vez se mueve de la limpieza de una jaula a otra)
 - En los refugios de rescate, por favor, entrenar a sus voluntarios para que informen al empleado encargado de la instalación si observan cualquier signo de enfermedad en cualquier gato.
 - Por favor considere aislar los gatos enfermos para evitar la diseminación de infecciones (no solo FCoV)

